

Příbalová informace
Informace pro použití, čtěte pozorně

DOBEXIL H UNG

Rektální mast

Držitel rozhodnutí o registraci

Valeant Czech Pharma s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobci

Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

ICN Polfa Rzeszów S.A., Rzeszów, Polsko

Složení

Léčivé látky: Calcii dobesilas monohydricus 40 mg, Lidocaini hydrochloridum monohydricum 20 mg v 1 g masti

Pomocné látky: Antioxidant pro tuky s butylhydroxytoluenem, polysorbát 80, propylenglykol, makrogol 400, makrogol 3350

Indikační skupina

Antihemoroidale (k ošetření hemoroidů)

Charakteristika

Dobexil H ung je přípravek pro místní použití, který obsahuje směs látek tlumících příznaky hemoroidálních a dalších onemocnění konečníku.

Dobesilan vápenatý upravuje porušenou funkci stěn hemoroidálních žil, tlumí jejich zvýšenou propustnost, zvyšuje jejich odolnost a snižuje tvorbu otoků.

Lidokain místně znecitlivuje sliznici a kůži a tím snižuje svědění a bolest.

Na postižená místa příznivě působí i mastný charakter mast'ového základu, který brání sliznici před mechanickým a chemickým drážděním.

Indikace

Mast Dobexil H ung používají dospělí a mladiství jako podpůrnou léčbu při hemoroidech a dalších onemocněních konečníku, jako jsou bolestivé trhliny kůže (anální fisury) a svědění v okolí konečníku (pruritus ani). Mast Dobexil H ung potlačuje zánět a mírní příznaky, jako jsou zduření, bolest a pálení ve všech stádiích těchto onemocnění. Mast Dobexil H ung je vhodná zejména, je-li přítomno svědění.

Kontraindikace

Mast Dobexil H ung se nesmí používat při známé přecitlivělosti na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku, při těžším onemocnění srdce a ledvin.

Přípravek není určen pro děti do 15 let.

Přípravek se neužívá v těhotenství a při kojení.

Nežádoucí účinky

Mast Dobexil H ung v doporučeném dávkování vyvolává nežádoucí účinky jen zřídka. U citlivých jedinců se mohou vyskytnout alergické reakce, např. kožní vyrážky nebo podráždění konečníku, které se projevuje jako pálení a svědění.

Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte o dalším používání přípravku s lékařem.

Interakce

Vzájemné ovlivnění účinku masti Dobexil H ung a jiných současně používaných léků není známo. V případě, že užíváte jiné léky, a to na lékařský předpis i bez něj, poraďte se o vhodnosti podávání masti Dobexil H ung s lékařem.

V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že používáte mast Dobexil H ung.

Dávkování a způsob použití

Mast se vtlačuje do konečníku pomocí nástavce aplikátoru nebo nanáší do jeho okolí 2krát denně (ráno a večer), nejdéle po dobu 14 dnů. Před každým ošetřením a zvláště po stolici je nutné místo v okolí konečníku pečlivě omýt či lépe osprchovat studenou vodou.

Upozornění

Nedojde-li do 14 dnů k ústupu obtíží nebo naopak dojde ke zhoršení obtíží či se vyskytnou neobvyklé reakce, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem. Některé příznaky tohoto onemocnění, zejména krvácení a bolest, mohou být příznaky jiných onemocnění, která je třeba včas léčit.

Při onemocněních konečníku je zvlášť důležité dbát o hygienu a pečovat o pravidelnou stolici. Je proto nutné pít dostatečné množství tekutin, jíst málo kořeněnou stravu obsahující vlákninu.

Při náhodném požití masti dítětem ihned vyhledejte lékaře.

Varování

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Uchovávání

Uchovávejte při teplotě 10-25°C v dobře uzavřeném původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem a světlem.

Balení

1x20 g rektální masti

Datum poslední revize

6.10.2009

Příbalová informace
Informace pro použití, čtěte pozorně

DOBEXIL H SUP čípky

Držitel rozhodnutí o registraci

Valeant Czech Pharma s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Složení

Léčivé látky: Calcii dobesilas monohydricus 250 mg, Lidocaini hydrochloridum monohydricum 40 mg v 1 čípku

Pomocné látky: Čípkový základ H 15 a W 35, antioxydant pro tuky s butylhydroxytoluenem

Indikační skupina

Antihemoroidalum (k ošetření hemoroidů)

Charakteristika

Dobexil H sup je přípravek pro místní použití, který obsahuje směs látek tlumících příznaky hemoroidálních a dalších onemocnění konečníku.

Dobesilan vápenatý upravuje porušenou funkci stěn hemoroidálních žil, tlumí jejich zvýšenou propustnost, zvyšuje jejich odolnost a snižuje tvorbu otoků.

Lidokain místně znecitlivuje sliznici a kůži a tím snižuje svědění a bolest.

Na postižená místa příznivě působí i mastný charakter čípkového základu, tvořícího hmotu čípku, který brání sliznici před mechanickým a chemickým drážděním.

Indikace

Čípky Dobexil H sup používají dospělí a mladiství jako podpůrnou léčbu při hemoroidech a dalších onemocněních konečníku, jako jsou bolestivé trhliny kůže (anální fisury) a svědění v okolí konečníku (pruritus ani). Čípky Dobexil H sup potlačují zánět a mírní příznaky, jako jsou zduření, bolest a pálení ve všech stadiích těchto onemocnění. Čípky Dobexil H sup jsou vhodné zejména, je-li přítomno svědění.

Kontraindikace

Čípky Dobexil H sup se nesmějí používat při známé přecitlivělosti na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku, při těžším onemocnění srdce a ledvin.

Přípravek není určen pro děti do 15 let.

Přípravek se nepoužívá v těhotenství a při kojení.

Nežádoucí účinky

Čípky Dobexil H sup v doporučeném dávkování vyvolávají nežádoucí účinky jen zřídka. U citlivých jedinců se mohou vyskytnout alergické reakce, např. kožní vyrážky nebo podráždění konečníku, které se projevuje jako pálení a svědění.

Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte o dalším používání přípravku s lékařem.

Interakce

Vzájemné ovlivnění účinku čípků Dobexil H sup a jiných současně používaných léků není známo. V případě, že užíváte jiné léky, a to na lékařský předpis i bez něj, poraďte se o vhodnosti podávání čípků Dobexil H sup s lékařem.

V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že používáte Dobexil H sup čípky.

Dávkování a způsob použití

Čípky si zavádějí dospělí a mladiství do konečníku pokud možno po stolici a po omytí, 2krát denně (ráno a večer) jeden čípek.

Před použitím uvolněte čípek roztržením nastřížené fólie nad špičkou čípku.

Upozornění

Nedojde-li do 7 dnů k ústupu obtíží nebo naopak dojde ke zhoršení obtíží či se vyskytnou neobvyklé reakce, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem. Některé příznaky tohoto onemocnění, zejména krvácení a bolest, mohou být příznaky jiných onemocnění, která je třeba včas léčit.

Při onemocněních konečníku je zvlášť důležité dbát o hygienu a pečovat o pravidelnou stolici. Je proto nutné pít dostatečné množství tekutin, jíst málo kořeněnou stravu obsahující vlákninu.

Při náhodném požití čípků dítětem ihned vyhledejte lékaře.

Varování

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Neupoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkem. Chraňte před mrazem.

Balení

10 čípků

Datum poslední revize:

6.10.2009