

Příbalová informace.

Informace pro použití, čtěte pozorně !

CARBO MEDICINALIS

(Carbo activatus)

tablety

VÝROBCE

ICN Polfa Rzeszów Spółka Akcyjna., Rzeszów, Polsko

SLOŽENÍ

Účinná látka: Carbo activatus (medicínální uhlí) 300 mg v jedné tabletě.

Pomocné látky: Sacharóza, povidon, stearan hořečnatý.

INDIKAČNÍ SKUPINA

Střevní adsorbens.

CHARAKTERISTIKA

Medicínální uhlí je látka se silnými adsorpčními a ochrannými vlastnostmi. Po požití ústy pokrývá sliznici trávicího ústrojí a chrání ji před dráždivými účinky některých složek potravy, adsorbuje (váže na sebe) střevní plyny, hnilobné produkty, toxiny, různé toxické produkty látkové přeměny, léčiva a jiné chemické sloučeniny. Má i protiprůjmový účinek.

INDIKACE

Nadýmání, větry, nadměrný rozklad potravy ve střevech, průjemy po dietní chybě, zánět žaludku a střeva, vředy ve střevech. Bez porady s lékařem mohou přípravek krátkodobě (nejdéle 2 dny) užívat dospělí, včetně těhotných a kojících žen, kteří trpí nadýmáním, větry nebo průjmem po dietní chybě. Na doporučení lékaře může být přípravek podáván dětem od 3 let věku. Pouze na doporučení lékaře mohou přípravek užívat dospělí, kteří trpí nadměrným rozkladem potravy ve střevě, současným zánětem žaludku a střeva nebo vředy ve střevech.

KONTRAINDIKACE

Přípravek se nepodává dětem do 3 let věku.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Kromě černého zbarvení stolice, které by mohlo zakrýt krvácení do trávicího ústrojí, nejsou žádné další nežádoucí účinky přípravku známy. Při případném výskytu neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku, či jeho podávání dítěti, poraďte neprodleně s lékařem.

INTERAKCE

Přípravek může snižovat vstřebávání a tím účinky jiných léčiv, např. salicylátů, barbiturátů nebo glutetimidu. Proto musí být mezi užitím přípravku a užíváním jiných léků dodržen interval alespoň dvou hodin.

DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB POUŽITÍ

Dospělí

U onemocnění, kdy je přípravek užíván bez porady s lékařem (s výjimkou průjmů, kde je dávka vyšší), užívají dospělí 2 – 5 tablet 3 – 4krát denně. U průjmů mohou dospělí užívat 10 – 12 tablet 3 – 4krát denně. U onemocnění, kdy dospělí užívají přípravek na doporučení lékaře, určí dávku a délku léčby lékař. Dospělí mohou tablety před spolknutím rozkousat a zapít sklenicí vody nebo hořkého čaje, nebo je mohou rozdrtit či nechat rozpadnout v malém množství vody a suspenzi vypít a zapít sklenicí vody nebo hořkého čaje.

Děti od 3 let věku

U dětí určí přesné dávkování a délku léčby vždy lékař. Obvyklá dávka je 2 – 5 tablet 3 – 4krát denně, u průjmů obvykle 4 – 5 tablet 4krát denně. Dětem se tablety podávají vždy jako suspenze vzniklá rozdrčením nebo rozpadnutím tablet v malém množství vody a dávku dítě zapíše sklenicí vody nebo hořkého čaje.

UPOZORNĚNÍ

O vhodnosti užívání (podávání dítěti) přípravku současně s jinými léky se vždy poradte s lékařem. Přípravek nesmí být užíván současně se zmrzlinou nebo čokoládou, které snižují jeho účinnost ! Jestliže se do 2 dnů příznaky nezlepší, zhoršují se nebo se projeví neobvyklé reakce, poradte se o dalším užívání přípravku (jeho podávání dítěti) s lékařem. Při předávkování, které se projeví zácpou, nebo při náhodném požití nezjistitelného množství tablet dítětem se poradte s lékařem.

UCHOVÁVÁNÍ

Přípravek se uchovává na suchém místě při teplotě 15°- 25°C.

VAROVÁNÍ

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí.

BALENÍ

20 tablet v blistru.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE

28. 6. 2000